






Guia de tractaments en prefloració

Aquests tractaments són orientatius, cal ajustar-los amb els problemes específics de cada explotació, incidències climàtiques i exigències comercials.

Estat Fenològic	EFFECTE	NOM COMERCIAL	ECO	Nº REG.	DOSI / Ha	OBSERVACIONS
	Psila	SURROUND WP		24689	25 kg	Temperatura > 5 °C Repetir després de pluges. Mantenir arbres blancs. Fer <i>frapage</i> .
		KAISO SORBIE o PLINTO STAR		25722 25479	350 g 0,5 L	Si es detecten adults.
	Millorar quallat	INSECTOIL +	*	ES-00291	5 L	Apliació foliar
		PLACLOT		23342	1 L	
	Pugons	INSECTOIL	*	ES-00291	15 L	
	Poll S. José	PROXIMO		24542	0,5 L	
	Psila	APACHE		21854	1 L	
	Xancres	PROCOBRE		24808	2,4 Kg	
	Pseudomonas	LABICUPER	*	CE	1,5 L	

Observacions per a tots els tractaments:

A. Reservem la utilització de fungicides sistèmics per a després de la floració, per tal d'evitar resistències.

B. L'ordre de preparació del brou és:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Regulador de pH | 6. Líquids emulsionables EC-EW |
| 2. Boses hidrosolubles | 7. Mullants |
| 3. Grànuls dispersables SG o WG | 8. Concentrats Solubles SL |
| 4. Pols mullables | |

C. Si observeu problemes de bufons (taus, talps...), tenim un servei de control autortitzat d'aquests rosegadors, o bé podeu aplicar el producte si disposeu del carnet específic (fumigants).

D. Amb problemes de conills en esponges, vies i canals, podem oferir el seu control com a empresa de tractaments biocides.

