


GUÍA de TRATAMIENTOS desde estado B hasta CAÍDA DE PÉTALOS

Estos tratamientos son orientativos, se deben ajustar con los problemas específicos de cada explotación, incidencias climáticas y exigencias comerciales.



Estado fenológico	Plaga/enfermedad	Materia activa	Nombre comercial	ECO	Nº Reg.	Dosis	Observaciones
B	Fusicocum, monilia, bacteriosis, pulgón, trips, anarsia	Permanganato de potasio	AGROENHANCER		CE	2 l/hl	
B - C	Piojo Ceniza Monilia Abolladura	Polisulfuro de calcio	CURATIO	Sí	13792	80 l/Ha	
C - D	Abolladura, fusicocum, monilia, pulgón, piojo, anarsia.	Aceite parafina + Acetamiprid + Piriproxifen + Oxicl. Cu + Cu complejoado	INSECTOIL + CARNADINE + PROXIMO + PROCOBRE + LABICUPER		ES00291 ES00629 24542 24808 CE	1 l 35 g 300 g 50 g 100 cc	OPCIÓN 1
C - D	Abolladura Poll Lepidópteros Pulgón	Dodina + Piriproxifen + Acetamiprid + Regulador pH	CAIREL + PROXIMO + CARNADINE + TRIPLEFAE		23392 24542 ES-00629 CE	250 cc 100 cc 35 cc 50 cc	OPCIÓN 2

Observaciones para todos los tratamientos:

- Reservamos el uso de fungicidas sistémicos después de la floración para evitar resistencias.
- El orden de preparación del caldo es:
 - Regulador de pH
 - Bolsas hidrosolubles
 - Gránulos SG o WG
 - Polvos mojables
 - Susp. concentradas SC-Flow
 - Líquidos emulsionables
 - Mojantes
 - Concentrados solubles SL
- Si observa problemas de topos o topillos, tenemos un Servicio de control autorizado de estos roedores, también puede Arvalinphos si dispone del carnet de fumigador.
- Con problemas de conejos en taludes, vías y canales, disponemos de autorización para tratar con Arvalinphos.